

बोटबाट बढी उत्पादन लिन सकिन्छ। प्लाष्टिक विछ्याई चिरवा मात्र हुर्कन दिएमा भारपात कम आउने र चिस्यानको मात्रा कायम रहने र फल रु पातहरुले माटोमा छुन नपाउने हुदा रोग लाग्ने संभावना कम हुन्छ।

उत्पादन

राकोको उत्पादन जात हैरी सरदर १२-१४ मे टन प्रति हेक्टर सम्म हुन सक्छ। काँक्रो प्रयासमय टिपेपछि छिटो खानु पर्दछ। १०. से. तापक्रम र ८५% सापेक्षित आद्रतामा २ हप्तासम्म भण्डारण गरी राख्न सकिन्छ।

रोग र किरा व्यवस्थापन

काँक्रोमा लाग्ने रोगहरु मध्ये पाउडरी मिल्ड्यु र डाउनी मिल्ड्यु प्रमुख रोगहरु हुन्। पाउडरी मिल्ड्यु रोग लाग्दा पातको माथिल्लो भागमा सेतो पाउडर जस्तो धुलो र डाउनी मिल्ड्यु लाग्दा पातको तलपट्टी पानीले भिजे जस्तो रातो दाग र पछि गएर पात सुकेको जस्तो देखिन्छ। यी रोगको नियन्त्रण गर्नका लागि क्याराथेन २ ग्राम प्रति लिटर पानीमा घोली १५ दिनको फरकम ३ पटक पातमा स्प्रे गर्नु पर्दछ।

व्यवसायिक रूपमा काँक्रोको खेती गर्ने कृषकले यसमा लाग्ने रोगहरुको नियन्त्रण गर्न निम्न उपाय गर्नु पर्दछ।

- पहिलो दिन ८ लिटर पानीमा सिसाको १ चिया गिलास नतलाएको दुध मिसाई पातमा स्प्रे गर्ने।
- त्यसको २ दिनपछि प्रिमेन्टल १ ग्राम प्रतिलिटर पानीमा मिसाई २-३ छप्टा भिजाई राख्ने त्यसको २ दिनपछि क्ल्याक्सल गोल्ड २ ग्राम प्रति लिटर पानीमा, मल्टिप्लस्म ३ ग्राम प्रति लिटर पानीमा स्ट्रुटोमाइसेन २ ग्राम प्रति १० लिटर पानीमा मिसाई छर्ने। यो प्रक्रिया काँक्रो वाली लिते अबधिसम्ममा ३ पटक प्रयोग गर्नु पर्दछ।
- ५ लिटर पानीमा १ कि.ग्रा. गोबरको दरले प्लाष्टिक भाँडामा १०-१५ दिनसम्म र ढक्ने अनि काँक्रो ४-५ पाते भएपछि प्रति बोट १ गिलास राज्जाले विभिन्न रोगकिरा लानवाट बचाउनुको साथै चिरवालाई मल समेत प्रदान गर्दछ।
- रातो खपट किराको लागी मालाधियान ५०% ई.सी. (मालाधियान रिमेडी, सायधियान, सुयाधियान) २ मिलिलिटर प्रति लिटर पानीमा घोली स्प्रे गर्ने। यससँगै निममा आधारित कीटनाशक विपादि छर्ने। कृहेर भन्नेको फललाई बटुली गहिरा खाडलमा हाली परी दिनु पर्दछ।
- फल कुहाने औसाको लागी औसाको माउ भिँगा यता उता उडेको देखासाथ मालाधियान ५०% ई.सी. (मालाधियान रिमेडी, सायधियान, सुयाधियान) २ मिलिलिटर प्रति लिटर पानीमा घोली स्प्रे गर्ने। यससँगै १० ग्राम चिनी वा भेली मिसाई ७ दिनको फरकमा छर्कनु पर्दछ। अथवा मिथाइल क्युलियरको फेरोमेन ट्रेप प्रति कठ्ठा ३ बटाका दरले जमिन भन्दा २ फिट उचाईमा भन्ड्याउनु पर्दछ।
- काँक्रोमा हर्मोनको प्रयोग
- काँक्रो वालीमा निब्रेलिक एसिड (GA) १००० पि.पि.एम.को भोल बनाई वनाई २ देखि ४ पाते हुदा छर्केमा चिरवामा भाते फूल बढाई भाते र पोथी फूलको अनुपात भिन्न र फूल भर्नबाट रोकिन्छ। उत्पादन बढ्छ। त्यसै गरी इथ्रेल २००-५०० पि.पि.एम. अथवा मैलिक हाइड्राजाइड(Melic Hydrazide) ५०-१०० पि.पि.एम.मा छरेमा पोथी फूलहरु बढाई भाते र पोथी फूलको अनुपात भिन्नाउँछ।

- काँक्रो वालीमा मल्टिप्लेक्स ३ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाई छर्कने गर्नाले फूल भर्नबाट जोपिन्छ र उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ।

वीउ उत्पादन

यो परसेचित वाली भएकाले मुल वीउ उत्पादनका लागी एक जात देखि अर्को जातको दूरी १००० मिटर र उन्नत वीउको उत्पादनका लागी ४०० मिटर कायम गरी लगाउनु पर्दछ।

रोलिङ

गुणस्तरीय वीउ उत्पादन गर्न फल फुल्नु अगाडी, फलको विकास हुने समयमा र फल टिप्ने अवस्थामा रोगी चिरवा रोगाङ्ग गरी हटाउनु पर्दछ।

टिप्ने अवस्था

फल हरियो रङबाट खैरो रङ्ग भएपछि भौतिक रूपले पुरा परिपक्व भएपछि टिप्नु पर्दछ। यस्तो बेलाका काँक्रोका वीउहरु पुरा पाकी सकेका हुन्छन्।

वीउ निकाल्ने

काँक्रोको गरीलाई प्लाष्टिक वा माटोको भाँडेमा १-२दिनसम्म राख्ने र वीउलाई निकाल्ने। यसरी निकालेको वीउलाई सफा पानीले २-३ पटक धोएर सुकाउनु पर्दछ। वीउलाई प्याकिङ गर्न यसमा चिस्यान १०% सम्म हुनु पर्दछ। भने लामो समयसम्म भण्डारण गर्न ६% चिस्यान हुनु पर्दछ।

वीउ उत्पादन

काँक्रोको औसत वीउ उत्पादन १००-२०० कि.ग्रा. प्रति हेक्टर सम्म हुन्छ।

समाप्त

काज्जा खेती प्रविधि



सुचिकी प्रदेश सरकार
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

पाल्पा

परिचय

काँक्रा कुकुरीबेटसी (Cucurbitaceae) परिवार अन्तर्गत पर्ने लहरे वाली हो । यसको उत्पत्ति नेपाल र भारतको दक्षिण पृथ्वी भागमा भएको मानिन्छ । अन्य लहरे वाली जस्तै काँक्रो पनि धेरै गर्मी र धेरै जाडो, तुसारी र कुहियो सहन नसक्ने वाली हो । यसलाई लामो समयसम्म न्यानो तापक्रम आवश्यक पर्दछ । सरदर २५-३० सेन्टिग्रेट तापक्रम वोट वृद्धि फल लाग्न उत्तम मानिन्छ भने रातको तापक्रम १५ सेन्टिग्रेट भन्दा कम भएमा फल लाग्दैन, फल लाग्ने गर्दा पनि वाष्पित्व, वटारिएका हुन्छन् । पौष्टिक हिसाबले काँक्रोमा मिठाभिन वि, सि र क्याल्सियम, फस्फोरस र पोटास बढी पाइन्छ ।

वनस्पति विवरण

काँक्रोको बोट कम लहरा देखि बढी लहरा जाने, हाँगा हुने र पातमा ३-५ छण्ड परेको हुन्छ । साथै पातको फेदबाट ल्यान्डरार निस्कन्छ । काँक्रो बोटको जरा लामो, गहिरोसम्म जाने हुन्छ । एउटै बोटमा भाले र पौथी फूलहरु फुल्ने गर्छन् ।

जातहरू

- कुशले: यो जात भदौ असोज अर्थात् सुख्खा मौसममा र जहाँ कुहियो कम लाग्छ त्यहाँ उत्पादन लिन सकिन्छ । अगोटै वालीको रूपमा लगाउन सकिन्छ । फल हल्का हरियो काडाँ उम्रेका जस्ता देखिने, खाँदा मिठो स्वाद र बीउ रोपेको ७५-८० दिनमा पहिलो पटक टिप्न सकिन्छ । यसको खेती तराई र मध्य पहाडी क्षेत्रमा गर्न उपयुक्त मानिन्छ ।
- भक्तपुर स्थानीय: फल ठुलो हल्का हरियो सेतो र धेरै लहरा जाने र भौगिने खालको हुन्छ । यो जात मध्य पहाडी क्षेत्रमा खेती गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसको उत्पादकत्व ३०-३५ मे.टन प्रति हेक्टर रहेको छ । ६० देखि ६५ दिनमा टिप्न सकिन्छ ।
- मालिनी: अगोटै र पछौटै दुवै वालीको लागी उपयुक्त, माटोमा विस्तारन कम भएमा स्वाद तिलो हुन सक्छ ।
- निज्या: यो वेर्ना सारोको ४५ दिनमा पहिलो पटक टिप्न सकिने, अगोटै वालीको रूपमा लिन सकिने र साउन-भदौमा उत्पादन लिन सकिने जात हो ।
- डाइनास्टी: यो वर्षाशंकर पहिलो पुस्ताको जात हो। नेपाल सरकारबाट वि.सं. २०६६ सालमा सूचीकृत गरिएको हो । तराई देखि उच्च पहाड सम्म खेती गर्न सकिने, वेर्ना सारोको करिब ४२ दिन पछि पहिलो पटक टिप्न सकिन्छ ।
- बेली: यो पनि वर्षाशंकर पहिलो पुस्ताको जात हो। वेर्ना सारोको करिब ४० दिनमा पहिलो पटक टिप्न सकिने, प्रति हेक्टर ४०-७० मे.टन उत्पादकत्व भएको, उच्च पहाड देखि तराईसम्म यसको खेती गर्न सकिने ।

भाटो

काँक्रा खेतीको लागि बलौटे बोमट देखि पाँगो बोमट माटो उपयुक्त हुन्छ । पर्याप्त प्राङ्गारिक पदार्थ भएको ५.५ देखि ६.५ पि.एच. भएको माटो उत्तम मानिन्छ । काँक्रो वाली ५.५ पि.एच. भन्दा कम अर्थात् अभिन्य माटोमा सबैदशगल हुन्छ र विरवाको वृद्धि र उत्पादनमा असर पर्दछ ।

वेर्ना उत्पादन प्रविधि

वेर्नाममी खेतीको लागी पौष महिनामा वेर्ना तयार गरी माघको पहिलो वा दोश्रो हप्ता

तापक्रम बढ्न थालेपछि वेर्नालाई खेतवारीमा सार्ने प्लाष्टिकको थैलामा बीउ जमाउनु पर्दछ ।

आवश्यक सावधानी:

प्लाष्टिक थैला ४"X६" आकारको थैला, कम्पोट वा गोबर मल, माटो, वाँसको भाटा र उन्नत तथा वर्षाशंकर जातको गुणस्तरीय बीउ आवश्यक हुन्छ ।

- १ मिटर चौडाई र आवश्यकता अनुसार लम्बाईको करिब एक विंता गहिरो गरी नर्सरी ब्याड तयार गर्ने ।
- २.५ मिटर लामा बाँसका भाटालाई नुगाई उक्त ब्याडमा प्लाष्टिक ओढाई गुम्बोज बनाउने र गुम्बोज अर्धगोलाकार हुनुपर्दछ ।
- २ भाग माटो, २ भाग पाकेको गोबर मल र १ भाग बालुवाको मिश्रण तयार गर्ने । यसको साथै २ ग्राम मालाधियान पाउडर प्रति कि.ग्रा. माटोमा मिसाउने ।
- तयारी माटोको मिश्रणलाई ४"X६" आकारको थैलामा २-३ से.मी. छोडेर भर्ने र हलका तिरिकात्तै खार्ने ।
- बीउलाई १२-२४ घण्टा सम्म पानीमा भिजाउने र प्रत्येक थैलामा ३ से.मी. गहिरो गरी २ वटा बीउ रोप्ने । बीउ अंकुरण गराई रोपदा अन्न छिटो र राम्ररी उम्रन्छ ।
- त्यसपछि यसलाई गुम्बोज भित्र ठाडो गराई टमक्क मिलाएर राख्ने, पानीले भिजाउने र माथिबाट परालले पातलो गरी छापो हाल्ने । अर्नि प्लाष्टिक सिटले ढाकी दिने ।
- प्लाष्टिक सिट दिउसो धाम लागेको बेला हटाउने र बेलुका राख्ने । चिसो हावा चले मा वा पानी परेमा दिउसो पनि ढाकी दिने ।
- विरवा उम्रेपछि परालको छापो हटाई दिने, आवश्यकता अनुसार पानी दिने, रोग दे खा परेभिटिन १ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाई छर्ने । साथै १ ग्राम युरिया प्रति लिटर पानीमा मिसाई छरेमा विरवा राम्रोसँग बढ्छ ।
- बीउ राखेको २०-२५ दिनमा विरवा ३-४ पाले भएपछि मुख्य खेतमा लगेर सार्ने ।

काँक्रोको बीउ उगाई कृषक तरीका

- काँक्रोको वेर्नाहरु वेर्नासम्म तयार गरी रोप्न र मुख्य समयभन्दा १-२ महिना अगाडी रोपी राम्रो वजार मुल्य पाउनको लागी राम्रोसँग बीउ उमार्न निम्न तरीका अपनाउनु सकिन्छ ।
- वजारको भाग अनुसारको बीउ छनौट गर्ने ।
- बीउलाई १२-१४ घण्टासम्म पानीमा भिजाउने ।
- भिजाएको बीउलाई सेतो पातलो कपडामा राख्ने र पानी ओभाउनु दिने ।
- आफ्नो घरको आँगनमा रहेको गाईभैसीलाई कुडो बनाउन राखेको चुल्होको करिब १ हात टाढा १-१.५ हात गहिरो हात छिराउन सकिने खाल्टो चुल्होको तलतिर पर्ने हिसाबले खन्ने ।
- त्यसपछि कपडामा राखी तयार गरेको बीउको पोकोलाई त्यस खाल्टोको तल राख्ने र माथिबाट कपडोको वा परालको तल्लो वनाई खाल्टोको प्वाल बन्द गरिदिने ।
- २-३ दिनमा बीउको निरीक्षण गर्ने र यसरी बीउ राखेको ३-४ दिनमा बीउमा टुसा निस्कन थाल्छ ।

➤ यसरी उम्रेको बीउलाई प्लाष्टिक थैलामा माटो भरी माथि बत्ताए, जस्तै गुम्बोज बनाई राख्न सकिन्छ, अथवा सिधै खेतवारीमा लगाउन सकिन्छ । सिधै खेतवारीमा लगाउदा लगाएपछि भुस वा परालले छोपेरिनु पर्दछ ।

बीउ उमार्दा मुख्य गरी तापक्रमलाई ख्याल गर्नु पर्दछ । त्यसैले धेरै तापक्रम नहोस् भन्नाका लागी बीउ उमार्ने खाल्टो चुल्होको धेरै नजीक वनाउनु हुदैन ।

बीउ दर

प्रति कठो ६५-७० ग्राम

रोखे सज्जा

तराईमा काँक्रा रोप्नेको लागी मुख्य समय माघ-फाल्गुन हो भने वेर्नाममी खेती गर्नको लागी पौषमा वेर्ना तयार गरी रोप्नु पर्ने हुन्छ । जुन स्थानमा वाक्को कुहियो नलाग्ने हुन्छ त्यहाँ कुशले जातको काँक्रो भदौ असोजमा लगाई कार्तिक मीरमा पनि फलेको पाइएको छ । मध्य पहाडमा फाल्गुन-चैत्रमा रोपिन्छ भने उच्च पहाडमा वैशाख देखि जेष्ठसम्म काँक्रो रोप्न सकिन्छ ।

जलाभा तयारी र अन्नखाद

काँक्रो रोप्ने जग्गा २-३ पटक जोतेर समतल पार्नु पर्दछ । जग्गालाई २-२ मिटरको ड्याङ बनाउनु पर्दछ, रोप्ने दूरी अनुसार एक ड्याङमा २ वटा खाडल खनी प्रत्येक खाडलमा २ देखि ३ कि.ग्रा. गोबर मल वा कम्पोट मल राख्नु पर्दछ । प्रति रोपनी ५ कि.ग्रा. युरिया, ४ कि.ग्रा. र ३ कि.ग्रा. पोटास प्रयोग गर्न सकिन्छ । यदि जग्गा मलिलो छ भने सबै मलको मात्रा समानुपातिक रूपले घटाउनु सकिन्छ ।

आधा भाग युरिया, ६ पि.ए. र पोटास पुरै भाग मिसाउने र प्रति खाडल ४० ग्राम पर्ने गरी हाल्ने । बाँकी रहेको आधा भाग युरियालाई प्रति बोट २ देखि ३ भाग पर्ने गरी पहिलो पटक विरवाको लहरा जान थालेपछि र दोश्रो पटक फूल फूल थालेपछि दिनु पर्दछ । मल दिदा माटोमा चिस्थान हुनुपर्दछ । यसका साथै जुन माटोमा बढी किरा लाग्ने गरे को छ भने प्रति खाडल १० ग्राम मालाधियान धुलो राख्नु पर्दछ ।

रोखे दूरी र रोखे तरीका

काँक्रोको जात अनुसार २ मिटर लाइन देखि लाइन र १ मिटर बोट देखि बोटसम्मको दूरीमा ३०-४० से.मी. गहिरो गरी खाडल खनी माथि उल्लेख गरे अनुसारको मलखाद प्रयोग गर्नु पर्दछ । यसरी तयार गरेको खाडलमा ३-४ दिनपछि प्रति खाडल २ वाना पर्ने गरी २-३ से.सी. गहिरो गरी रोप्नु पर्दछ । रोप्ने समयमा जग्गामा चिस्थान कायम हुनु पर्दछ । प्लाष्टिक थैलामा विरवा उमारेर पनि माथि गरिएको खाडलमा विरवा सार्ने सकिन्छ ।

गोडोले र सिवाई

आवश्यकता अनुसार भारपात देखिपछि गोडिदिनु पर्दछ । विरवा ठुलो भई फूल थाले पछि हातले भारपात उखेली दिनु राम्रो हुन्छ । कोबालाले गोडिदा जरा या कण्डमा चोट लागेर जिवण्डाहरुले संक्रमण गर्न सक्छ । लहरा जाने र फूल फुल्ने समयमा पानीको निकै आवश्यकता पर्दछ । माटोको चिस्थान हेरी सिंचाई गर्नु पर्दछ ।

शाका दिने/छापो हाल्ने

यो वाली लहरा जाने हुँदा थाँका दिनु आवश्यक हुन्छ । हिउदमा थाँका दिन सकिएन भने विरवाको बरिपरि परालले छापो हाल्दिनु पर्दछ । साथै काँक्रोको पहिलो मुला चुडिदिनुमा धेरै लहरा निस्कन्छ र बढी फल लाग्दछ । थाँका नाँदएको बोट भन्दा हिरको