


विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमको छापो हाल्ने गरेको पाइन्छ । ती मध्ये अधिकांश ठाउँमा सल्लाको कुसुम, रूखका सुकेका पातहरू, हरियो पात समेतको स-साना हागाहरू र बाँचियो खर छापोको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । चाँडै सड्ने किसिमको छापो (हरियो वा सुकेका पातहरू) नै सबभन्दा उपयुक्त छापो मानिन्छ । बेसारको रोपाईँपछि सकेसम्म पुर्णरूपले माटो ढाकिने गरी ४-५ से.मी. बाक्लो छापो हाल्नु पर्दछ । सकेका पातहरू भए हावाले नउडाउने गरी छाप्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । ४० देखि ५० ठूलो डोका पात भए एक रोपनीका लागि पुग्दछ ।

सिचाई तथा गोडमेल:

बेसार सामान्यतया वर्षायाममा र पाखो बारीमा खेती गरिने हुदाँ सिचाईको आवश्यकता नपर्ने भए माटोको अवस्था हेरी वर्षात नभएको बेलामा करिव ३ हप्ताको फरकमा हल्का सिचाईको आवश्यकता पर्दछ । बेसार पानी जमेको नसहने हुदाँ निकासको उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । बेसारमा प्रशस्त मलखाद प्रयोग हुने र शुरुका अवस्थामा यसको कम बृद्धि हुनाले भारहरू चाँडै उम्री मुख्य बालीहरूसँग खाद्यतत्व, चिस्यान, प्रकाश आदिसँग प्रतिस्पर्धा गरी उत्पादनमा ह्रास गराउने हुदाँ भारपातको प्रकोप अनुसार २/३शटक गोडमेल गर्नु पर्दछ । पछिल्लो पटक हाल्नु पर्ने रासायनिक मल टप ड्रेसिङ्ग गर्नु अघि भार उखेली सफा गर्नु पर्दछ र उकेरा दिएमा उत्पादनमा बृद्धि हुन्छ र पानी जम्न पाउँदैन ।

बालीचक्र तथा अन्तरबाली:

लामो समयसम्म एउटै जग्गामा बाली लगाईरहदा त्यसबाट रोग र किराको प्रकोप बढ्न गई उत्पादनमा निकै ठुलो ह्रास आउन सक्दछ । तसर्थ यसलाई मकै, तोरी, उखु वा तरकारी आदी बालीको चक्रमा खेती गर्न सकिन्छ । यो बाली लगाउन उच्च जग्गाहरूमा चना, रहर, कोदो आदिको बालीचक्रमा पनि यसलाई मिलाउन सकिन्छ । यो एउटा छायाँ मन पराउने बाली भएकाले यसलाई फलफूल वनोचा, आप, कटहर, लिची, नरि बल, सुपारी, केरा आदिमा अन्तर बारीको रुपमा लगाउन सकिन्छ ।




बाली लिनै:

साधारणतया बेसार लगाएको ९ महिनामा बाली लिन सकिन्छ । पौष देखि फाल्गुणसम्म बाली लिनै उपयुक्त समय हो । बोटको पात पहेलिएर सुक्न थालेपछि खनाइकायँ शुरु गर्नु पर्दछ । हलाकि १/२ महिना अगाडी खेको बेसारमा कृकमिन तत्वको मात्रा बढी (१५-१८प्रतिशत) हुन्छ । गानो खन्नु भन्दा करिव ५/७ दिन अगाडी बोटको डाँठ गानोबाट छुट्याउनु पर्दछ । बाली लिन जग्गालाई कोदालोको सहायताले खनी त्यसबाट बेसारका गानाहरूलाई सुरक्षित किसिमबाट निकाल्नु पर्दछ । राम्रो गानाहरू छुट्याई अगामी साल बीउको लागि उचित भण्डारण गरि राख्नु पर्दछ । बीउ बाहेकको बेसारलाई विक्री गर्ने वा प्रशोधन गर्नु पर्दछ । प्रति रोपनी १५देखि २० कुन्टल काँचो बेसारको उत्पादन लिन सकिन्छ ।

बीउ भण्डारण:

बेसारमा चिस्यानको मात्रा धेरै हुने हुदाँ सुरक्षित किसिमबाट भण्डारण गर्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा भण्डारणमा सुक्ने, चाउरिने, कुहिने आदि समस्याहरू आई बेसारको गुणस्तर घट्न जान्छ । बेसार खेती एवं भण्डारणको प्रमुख समस्या नै गानो कुहिने रोग हो तसर्थ भण्डारण अघि बीउ गानोहरू तथा भण्डारण गरिने स्थान दुसी एवं कीटनाशक विषादिद्वारा उपचार गर्नु पर्दछ । बेसारलाई १२-१४ डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम र सापेक्षिक आद्रता ६५ देखि ७५ प्रतिशत मिलाउन सिकने कोठामा सजिलैसँग ५ देखि ६ महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । कृषकस्तरमा यस्तो किसिमको तापक्रम नियन्त्रित कोठा बनाउन प्रायः नसकिने भएकाले परम्परागत खाल्डोमा गरिने भण्डारणलाई केही सुधार गरी स्वस्थ बीउ भण्डारण गर्नु आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त देखिन्छ ।



बेसार खेती



सुचिबनी प्रदेश सरकार
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय
कृषि ज्ञान केन्द्र
पाल्पा

आ.व. २०८०/८१

बेसार खेती प्रविधि

बेसारलाई अंग्रेजीमा Turmeric भनिन्छ र यसको वैज्ञानिक नाम Curcuma longa Lin. हो र यो Zingiberaceae परिवार अन्तर्गत पर्दछ। यसको गानो र धुलो परापूर्वकाल देखि औषधी तथा खाद्य पदार्थमा रङ्गको लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ। यसको उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरूमा भएको मानिन्छ। बेसारमा पाइने प्रमुख तत्व कुरकुमीन "रङ्ग" हो। बेसारको गानोमा सरदर १.८ देखि ५.४ प्रतिशत सम्म कुरकुमीन पाइन्छ। यसको अलावा यसमा २.५-६.२ प्रतिशतसम्म वासनादार तेल पनि पाउन सकिन्छ। कुरकुमिन र तेल नै यसको औषधीय गुण हो। यो एक antioxidant युक्त खाद्य वस्तु हो जसले मानिसमा विभिन्न रोगहरूबाट सहनीशिलता दिलाउदछ। त्यसैले बेसारको दैनिक सेवनले मानिसको शरीर रोग नलाग्ने र तन्दुरुस्त बनाउन मद्दत गर्दछ। विश्वमा भारत, पाकिस्तान, चीन, बंगलादेश, नाइजेरिया, हाइटी, जमाइका, पेरू, आदि बेसारका प्रमुख उत्पादक राष्ट्रहरू हुन्। सामान्यतया तराई देखि उच्च पहाडसम्मका जिल्लाहरूमा बेसारको खेती परापूर्वकालदेखि नै गरिँदै आएको छ। तर सुनसरी, महोत्तरी, धादिङ्ग, काभ्रे, चितवन, बारा, पाल्पा, सल्यान, बाँके, बर्दिया, बझाङ्ग, कैलाली आदि बेसारको खेती गरिने प्रमुख जिल्लाहरू हुन्।

माटो र हावापानी :

बेसार (हलदो) मुख्यतया उष्ण हावापानीमा हुने वाली हो र यसलाई समुन्द्र सतहदेखि १२०० मीटरसम्मको उचाईमा सफलतापूर्वक खेती गर्न सकिन्छ मध्यम वर्षा हुने ठाउँ यसको लागि उपयुक्त हुन्छ। यसको खेती सिंचित एवं असिंचित हल्का कालो देखि दोमट र रातो माटोमा पनि गर्न सकिन्छ तर पानी नजम्ने बलौटे दोमट माटो यसको लागि उत्तम हुन्छ। पि.एच. ५.५-६.० भएको माटो बेसार खेतीको लागि उपयुक्त मानिन्छ। यसले धेरै चिसो र तुपारो सहन सक्दैन।

जोशानीको तयारी र मलखाद :

साधारणतया फाल्गुण तिर पानी परी सकेपछि ३-४ पटक खनजोत गरि राम्ररी कृत्रिम गोबरमल माटोमा मिलाई बुबुवाउदो, खुकुलो हुने गरी जग्गाको तयारी गर्नु पर्दछ। मलखादको मात्रा माटोको उर्वराशक्ति एवं माटोमा विद्यमान खाद्यतत्वको अवस्थामा भर पर्ने भएता पनि अदुवा वाली अनुसन्धान कार्यक्रमले मलखादको रूपमा साधारणतया ३०कि.ग्रा. नाइट्रोजन, ६० कि.ग्रा. फास्फोरस, ३० कि.ग्रा. पोटास र राम्ररी पाकेको गोबर मल/कम्पोस्ट मल ३०मे.टन प्रति हेक्टर सिफारिस गरेको छ।

प्रति रोपनी बेसार खेतीमा मलखादको प्रयोग मात्रा र समय तल उल्लेख गरिएको छ।

मलखाद	मात्रा र रोपनी र प्रयोग गर्ने समय
गोबर र कम्पोस्ट मल	१५००के.जी. जग्गा तयारी गर्ने बेला
डि.ए.पि.	३ कि.ग्रा. जग्गा तयारी गर्ने बेला
युरिया	१कि.ग्रा., ४० दिनमा
युरिया	१कि.ग्रा. तीन महिना पछि
म्युरेट अफ पोटास	३ कि.ग्रा. जग्गा तयारी गर्ने बेला र २ कि.ग्रा. रोपेको ४० दिन पछि।

जातहरू:

खेती गरिएका जातहरू संकलन र अध्ययन गरी अदुवा अनुसन्धान कार्यक्रम कपुरकोटले नेपालमा पनि कृषकहरूको लागि खेती गर्न कपुरकोट हलेदो १ र कपुरकोट हलेदो २ उन्मोचन गरिएको छ।

१ कपुरकोट हलेदो १ (सि.आइ. ८८०१)

जातिय विशेषता : वाली तयार हुन लागन समय २४५-२६०दिन, प्रति बोट गाँज (Tiller/clump) संख्या २/३ प्रति बोट, गानोको तौल २७५ ग्राम प्रति गानो, बीउ र उत्पादन अनुमान १.५-८, सरदर उत्पादन २७-८३ मे.टन प्रति हेक्टर

प्रयोगन विशेषता : बेसार धुलो बल्ने क्षमता: १३.८ प्रतिशत ताजा तौलमा र १२.८ प्रतिशत सुकेको तौलको आधारमा कुरकुमिनको मात्रा: ४. ८९ प्रतिशत, तेल: ६.६५ प्रतिशत

२ कपुरकोट हलेदो २ (सि.आइ. ०२०८)

जातिय विशेषता : वाली तयार हुन लागने समय: २४५-२६० दिन, प्रति बोट गाँज (Tiller/clump) संख्या २.६६ प्रति बोट, गानोको तौल ४२५ग्राम प्रति गानो, बीउ र उत्पादन अनुमान १.८-१.२, सरदर उत्पादन ३४.०५ मे.टन प्रति हेक्टर

प्रयोगन विशेषता : बेसार धुलो बल्ने क्षमता: १६.० प्रतिशत ताजा तौलमा र १४.० प्रतिशत सुकेको तौलको आधारमा कुरकुमिनको मात्रा: २.५८९ प्रतिशत, तेल: ३.७५ प्रतिशत

हलदो खेती समय :

चैत्रको पहिलो हप्ता बेसार लगाउने उपर्युक्त समय भएता पनि यो महिना भर लगाउन सकिन्छ। जति ढिलो भयो उत्पादन क्षमता घट्दै जाने हुन्छ।

बेसारको बीउ छनौट, बीउ दर र रोप्ने तरिका :

बेसारको फुलबाट फल नलाग्ने हुदाँ यसको वानस्पतिक भाग (गानो)लाई नै बीउको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

बीउ छनौट गर्दा सकेसम्म माथि उल्लेख गरिएको उन्नत जातको कम्तीमा दुईवटा उम्रने मुना भएको सरदर ३५ ग्रामको बीउ छान्नु पर्दछ। यसरी छानिएको बीउलाई २५ग्राम डाइथेन एम ४५ र १० ग्राम बेभिटिन, १० लिटर पानीमा घाली त्यसमा बीउ अथा घण्टासम्म डुबाउने र त्यसपछि छायाँमा ओभानो हुने गरी सुकाउने अनि रोप्नु पर्दछ। एक रोपनी क्षेत्रफलको लागि १५०-१७५कि.ग्रा. बीउ आवश्यक पर्दछ।

गाउघरमा हलको सियो पछाडी लगाउने चलन भएतापनि उन्नत तरिकाबाट उपर्युक्त दुरीमा लगाउदा ह्याङ्ग बनाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। १२० से.मी. चौडाईको ह्याङ्ग बनाई हार देखि हारको दुरी ३० से.मी. कायम गरी प्रत्येक हारको ५-७ से.मी. गहिराईमा २५-३० से.मी.को फरकमा साईजका गानो रोपण गर्नु पर्दछ। दुई ह्याङ्ग बिचमा ४० से.मी. खाली ठाउँ राख्दा पछि गोडमेल तथा अन्य काम गर्न सजिलो हुन्छ।

छापो हान्ने:

बेसारलाई चैत्र-बैशाखमा रोप्ने गरिन्छ र त्यस समयमा माटोको चिस्यान जोगाई राख्न छापोको अति ठुलो भूमिका र महत्त्व हुन्छ। बेसार प्रायः असिंचित जमिन मै खेती गरिने भएकाले लामो अवधिसम्म माटोमा चिस्यान बचाई राख्न छापोको नितान्त आवश्यक पर्छ। यसको अतिरिक्त छापोले भारको रोकथाम गर्छ, भूक्षयबाट बचाउछ र अन्तमा वर्षाको पानीले छापो सडन गई माटोमा प्राज्ञाधिक पदार्थ थपिन्छ र माटोको उर्वरा शक्ति बढ्छ जसको कारण बिरवाको राम्रो बृद्धि विकास भै उत्पादनमा समेत बृद्धि हुन जान्छ।

